

## Procédure

Retirer le capuchon de la seringue et visser solidement un embout applicateur sur la seringue.

1. Placer une petite goutte de gel dans chaque réservoir de la gouttière pour les dents sous traitement.
2. Placer la gouttière avec du gel sur les dents et appliquer une pression sur la gouttière pour disperser le gel.
3. S'il y a excédent de gel au pourtour de la gouttière, l'enlever à l'aide d'un coton tige.
4. Le traitement doit être appliqué 1 x pour une durée de 30 minutes.
5. Une fois le traitement terminé, rincer les gouttières avec de l'eau tiède et se brosser les dents.

## Notes

- Ne pas manger ou boire durant le traitement.
- Il est déconseillé de fumer et boire du café ou du vin rouge durant la période du traitement de blanchiment.

## Conservation et utilisation

- Conserver au réfrigérateur
- Retirer le gel du réfrigérateur avant l'application et l'utiliser à la température de la pièce.

## Précaution

Doit être utilisé sous le contrôle d'un(e) dentiste. Garder hors de la portée des enfants et des animaux. Les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas utiliser ce produit. S'il y a une réaction anormale lors de l'utilisation, cesser immédiatement le traitement et consulter votre dentiste.

**Si vous avez des questions ou si vous suspectez une complication, n'hésitez pas à nous contacter.**

---